

Sætning

Lad et andengradspolynomium være givet ved


$$f(x) = ax^2 + bx + c, \text{ hvor } a \neq 0.$$

Lad x_0 være ekstremumsstedet for andengradspolynomiets graf¹.

Da gælder følgende:

1. For c gælder det, at grafen for andengradspolynomiet skærer andenaksen i punktet $(0, c)$.
2. For b gælder det, at tangentens hældning i røringpunktet $(0, c)$ er b .
3. For a gælder det at²:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + ah^2 \text{ og } f(x_0 - h) = f(x_0) + ah^2 \text{ for alle } h \in \mathbb{R}$$



Figur der illustrerer sætningen. Man ser at grafen skærer andenaksen i punktet $(0, c)$, at **tangentens hældning**, i røringpunktet mellem tangenten og parabelen i punktet $(0, c)$, er b . Når man går negativ h eller positiv h ud fra ekstremumsstedet x_0 , da ændres funktionsværdien fra $f(x_0)$ til $f(x_0) + ah^2$. Dette er illustreret med **det blå linjestykke**.

¹ Husk at førstekoordinaten for toppunktet er givet ved $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

² Kan også skrives mere kompakt: $f(x_0 \pm h) = f(x_0) + ah^2$.

Bemærk, at man derfor fra viden om fortegnet for a viser, om parabelgrenene vender opad eller nedad. Man får fra $f(x_0 \pm h) = f(x_0) + ah^2$ også information om symmetri og bredde af parabelen.

Beviser

- Vi starter med at bevise punkt 1 i sætningen.

Idet $x = 0$ i punktet $(0, c)$ gælder det at:

$$f(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c$$

hvilket skulle vises.

- Vi beviser punkt 2 i sætningen.

Idet tangentens hældning i punktet $(0, c)$ er givet ved $f'(0)$ bestemmes først $f'(x)$.

$$f'(x) = 2ax + b$$

Deraf følger det at:

$$f'(0) = 2a \cdot 0 + b = b$$

hvilket skulle vises.

- Vi beviser punkt 3 i sætningen.

For ekstremumsstedet x_0 gælder det, at $f'(x_0) = 2ax_0 + b = 0$.

Vi finder således at:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= a(x_0 + h)^2 + b(x_0 + h) + c \\ &= a(x_0^2 + 2x_0h + h^2) + b(x_0 + h) + c \\ &= ax_0^2 + 2ax_0h + ah^2 + bx_0 + bh + c \\ &= ax_0^2 + bx_0 + c + (2ax_0 + b)h + ah^2 \\ &= f(x_0) + f'(x_0)h + ah^2 \\ &= f(x_0) + ah^2 \end{aligned}$$

hvilket skulle vises.

Med tilsvarende overvejelser som ovenfor, gælder det at:

$$\begin{aligned} f(x_0 - h) &= a(x_0 - h)^2 + b(x_0 - h) + c \\ &= a(x_0^2 - 2x_0h + h^2) + b(x_0 - h) + c \\ &= ax_0^2 - 2ax_0h + ah^2 + bx_0 - bh + c \\ &= ax_0^2 + bx_0 + c - (2ax_0 + b)h + ah^2 \\ &= f(x_0) - f'(x_0)h + ah^2 \\ &= f(x_0) + ah^2 \end{aligned}$$

hvilket skulle vises.³ ■

³ Hermed er det også vist, at parablen er symmetrisk.